

中华人民共和国国家标准

GB 30616—2020

食品安全国家标准

食品用香精

2020-09-11 发布

2021-03-11 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

前　　言

本标准代替 GB 30616—2014《食品安全国家标准 食品用香精》。

本标准与 GB 30616—2014 相比,主要变化如下:

- 修改了食品用香精、食品用热加工香味料、食品用香精辅料、液体香精、乳化香精的定义;
- 增加了食品用香料的定义;
- 修改了标准样品、浆(膏)状香精、拌合型粉末香精的术语和定义;
- 修改了胶囊型粉末香精的术语;
- 修改了“3.1 原料要求”;
- 修改了香味、水分、过氧化值、粒度、千倍稀释液稳定性、重金属含量、砷含量的检验方法;
- 修改了“4 标签”;
- 增加了附录 A“食品用热加工香味料的原料和工艺要求”和附录 D“食品用香精辅料 乙酸异丁酸蔗糖酯的质量规格”;
- 修改了附录 B 食品用香精中允许使用的辅料名单:
 - a) 表 B.1 中增加了明胶的 INS 编码;
 - b) 表 B.1 中增加了三乙酸甘油酯、柠檬酸三乙酯和异丙醇;
 - c) 表 B.2 中增加了对羟基苯甲酸乙酯钠、DL-酒石酸的 CNS 编码;
 - d) 表 B.2 中增加了迷迭香提取物脚注;
 - e) 表 B.2 中增加了 DL-苹果酸的 CNS 编码和 INS 编码;
 - f) 表 B.2 中增加了 DL-苹果酸钠的 INS 编码;
 - g) 表 B.2 中删除了甜菜红、高粱红、柑橘黄、天然胡萝卜素、木糖醇、罗汉果甜苷、赤藓糖醇。

食品安全国家标准

食品用香精

1 范围

本标准适用于食品用香精。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1 食品用香精

由食品用香料(2.2)与食品用香精辅料(2.4)组成的用来起香味作用的浓缩调配混合物(只产生咸味、甜味或酸味的配制品除外,也不包括增味剂)。食品用香精可以含有或不含食品用香精辅料。通常不直接用于消费,而是用于食品加工。

2.2 食品用香料

添加到食品产品中以产生香味、修饰香味或提高香味的物质。

食品用香料包括天然食用香味物质、天然食用香味复合物、食品用热加工香味料、烟熏食用香味料、食品用合成香料。

2.3 食品用热加工香味料

食品用热加工香味料为其香味特性而制备的一种产品或混合物。它是以食材或食材组分经过类似于烹调的食品制备工艺制得的产品。食品用热加工香味料中必定含有非酶褐变产物。

2.4 食品用香精辅料

为发挥食品用香精作用和(或)提高其稳定性所必需的任何基础物质(例如抗氧化剂、防腐剂、稀释剂、溶剂等)。

2.5 对照品

企业技术部门会同有关部门/人员对样品进行鉴定和评香,确定为检验用的特定物质。

2.6 液体香精

以液体形态出现的各类香精。

2.7 乳化香精

以乳浊液形态出现的各类香精。

2.8 浆膏状香精

以浆膏状形态出现的各类香精。

2.9 拌和型固体(粉末)香精

香气和(或)香味成分与固体(含粉末)载体拌合在一起的香精。

2.10 胶囊型固体(粉末)香精

香气和(或)香味成分以芯材的形式被包裹于固体壁材之内的颗粒型香精。

3 技术要求

3.1 原料要求

食品用香精使用的食品用香料应符合 GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的规定,食品用热加工香味料的原料和工艺要求应符合附录 A 的规定,食用酒精应符合 GB 31640《食品安全国家标准 食用酒精》的规定,植物油应符合 GB 2716《食品安全国家标准 植物油》的规定。允许使用的食品用香精辅料名单见附录 B。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

| 项目 | 要 求 | 检 验 方 法 |
|--------------------|------------|--------------|
| 色泽和状态 ^a | 符合同一型号的对照品 | 附录 C 中 C.2 |
| 香气 | 符合同一型号的对照品 | GB/T 14454.2 |
| 香味 ^b | 符合同一型号的对照品 | 附录 C 中 C.3 |

^a 在贮存期中,部分产品会呈轻度浑浊状态,有沉淀或变色现象,应不影响使用效果。乳化香精不进行色状的检定。
^b 香味的测定不适用于以动植物油为溶剂的产品。

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

| 项目 | 液体香精 | 乳化香精 | 浆膏状 香精 | 固体(粉末)香精 | | 检验方法 | | |
|--|----------------------------|------|-----------|----------|-----------------------------|------|--|--|
| | | | | 拌和型 | 胶囊型 | | | |
| 相对密度(25 ℃/25 ℃ 或 20 ℃/20 ℃或 20 ℃/4 ℃) | $D_{\text{对照品}} \pm 0.010$ | — | | | GB/T 11540 | | | |
| 折光指数(25 ℃ 或 20 ℃) | $n_{\text{对照品}} \pm 0.010$ | — | | | GB/T 14454.4 | | | |
| 水分/% \leqslant | — | | 20.0 | 15.0 | GB 5009.3—2016 中 第三法为仲裁法 | | | |
| 过氧化值 ^a /(g/100 g) \leqslant | 0.5 | — | | | GB 5009.227—2016 中 第一法 | | | |

表 2 (续)

| 项目 | 液体香精 | 乳化香精 | 浆膏状 香精 | 固体(粉末)香精 | | 检验方法 | | | |
|--|------|---|-----------|----------|----------------------------|-------------|--|--|--|
| | | | | 拌和型 | 胶囊型 | | | | |
| 粒度(规定范围) | — | ≤2 μm 并均匀分布 ^b | — | ≥90.0% | | 附录 C 中 C.4 | | | |
| 原液稳定性 | — | 不分层 | — | — | | 附录 C 中 C.5 | | | |
| 千倍稀释液稳定性 ^c | — | 无浮油、无沉淀 | — | — | | 附录 C 中 C.6 | | | |
| 重金属(以 Pb 计) 含量/(mg/kg) | ≤ | 10 | | | GB 5009.74 | | | | |
| 砷(以 As 计)含量 | ≤ | 3 mg/kg(当砷的含量大于此值时,再测定无机砷含量, 无机砷含量应≤1.5 mg/kg) | | | GB 5009.76 或 GB 5009.11 | | | | |
| 甲醇含量 ^d /% | ≤ | 0.2 | — | | | GB/T 7917.4 | | | |
| 注:相对密度、折光指数、水分、粒度、原液稳定性、千倍稀释液稳定性为出厂检验项目,型式检验为全项目检验项目,每年进行一次。 | | | | | | | | | |
| ^a 过氧化值的测定只适用于动植物油含量≥20%的产品。 | | | | | | | | | |
| ^b 乳化香精的粒度只适用于饮料用乳化香精。 | | | | | | | | | |
| ^c 千倍稀释液稳定性只适用于饮料用乳化香精。 | | | | | | | | | |
| ^d 甲醇含量的测定只适用于食用酒精含量≥20%的产品。 | | | | | | | | | |

3.4 微生物指标

微生物指标应符合表 3 的规定。

表 3 微生物指标

| 项目 | 乳化香精 | 浆膏状 香精 | 固体(粉末)香精 | | 检验方法 |
|-----------------------|------|-----------|----------|-----|-----------|
| | | | 拌和型 | 胶囊型 | |
| 菌落总数/(CFU/g 或 CFU/mL) | ≤ | 5 000 | 30 000 | | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/(MPN/g 或 MPN/mL) | ≤ | 3.6 | 15 | | GB 4789.3 |

4 标签

按照 GB 29924《食品安全国家标准 食品添加剂标识通则》进行标示,凡因含有食品用热加工香味料而无法检测相对密度和折光指数的液体香精,其产品标签上应标示本产品含有食品用热加工香味料。

5 其他

根据工艺需要,食品用香精中可以使用 GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中允许使用的着色剂、甜味剂和咖啡因,但加入的品种和添加量应与最终食品的要求相一致。

附录 A
食品用热加工香味料的原料和工艺要求

A.1 食品用热加工香味料的原料

食品用热加工香味料的原料包括蛋白氮源、还原糖源、脂肪或脂肪酸源和其他允许在热加工过程中使用的原辅料。

A.1.1 蛋白氮源

A.1.1.1 蛋白氮包括食品(畜、禽、蛋、乳制品、水产、谷物、豆类、果蔬、酵母)及其提取物。

A.1.1.2 以上的水解产物、自溶酵母/酵母抽提物、肽、氨基酸和(或)它们的盐。

A.1.2 还原糖源

A.1.2.1 含有碳水化合物的食品(谷物、豆类、果蔬)及其提取物。

A.1.2.2 单、双和多聚糖(食糖、糊精、淀粉、可食用胶)。

A.1.2.3 以上的水解产物。

A.1.3 脂肪或脂肪酸源

A.1.3.1 含有可食用油脂的食品。

A.1.3.2 来自动植物的可食用油脂。

A.1.3.3 酯交换的和/或分馏的油脂。

A.1.3.4 以上的水解产物。

A.1.4 其他允许在热加工过程中使用的原辅料

其他允许在热加工过程中使用的原辅料见表 A.1。

表 A.1 其他允许在热加工过程中使用的原辅料

| 类 别 | 名 称 |
|------|--------------------------|
| 一般原料 | 食品原料、食用草本植物、香辛料或以上原料的提取物 |
| | 水 |
| | 硫胺素及其盐酸盐 |
| | 抗坏血酸及其钠、钾、钙、镁、铵盐 |
| | 柠檬酸及其钠、钾、钙、镁、铵盐 |
| | 乳酸及其钠、钾、钙、镁、铵盐 |
| | 富马酸及其钠、钾、钙、镁、铵盐 |
| | 苹果酸及其钠、钾、钙、镁、铵盐 |
| | 琥珀酸及其钠、钾、钙、镁、铵盐 |
| | 酒石酸及其钠、钾、钙、镁、铵盐 |
| | 鸟苷酸和肌苷酸及其钠、钾、钙盐 |

表 A.1 (续)

| 类 别 | 名 称 |
|-----------------|-----------------------|
| 一般原料 | 肌醇 |
| | 钠、钾和铵的硫化物、氢硫化物和多硫化物 |
| | 卵磷脂 |
| 作为 pH 调节剂的酸、碱和盐 | 乙酸、盐酸、磷酸、硫酸及其钠、钾、钙、铵盐 |
| | 氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙和氢氧化铵 |
| 消泡剂 | 聚二甲基硅氧烷(不参与反应) |

A.2 食品用热加工香味料的工艺要求

食品用热加工香味料是用食品用热加工香味料的原料加工制得的, 加工原料中至少要含有一个 A.1.1 和一个 A.1.2 中所列原料, 并应符合下列要求:

A.2.1 加工温度不应超过 180 °C。

A.2.2 180 °C 时的加工时间不应超过 15 min, 加工温度降低时, 加工时间可相应延长。加工温度每降低 10 °C, 加工时间可延长 1 倍。例如, 加工温度 170 °C 时, 加工时间不应超过 30 min; 加工温度 160 °C 时, 加工时间不应超过 60 min; 以此类推。最长反应时间应控制在 12 h 以内。

A.2.3 加工时的 pH 不应超过 8.0。

A.2.4 热加工完成后须将食品用热加工香味料冷却至 70 °C 以下, 方可加入其他食品用香料或者食品用香精辅料以调配香精。

附录 B
食品用香精中允许使用的辅料名单

B.1 溶剂及载体

溶剂及载体见表 B.1。

表 B.1 溶剂及载体

| 序号 | 溶剂及载体中文名称 | 溶剂及载体英文名称 | CNS 编码 | INS 编码 |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | 阿拉伯胶 | arabic gum | 20.008 | 414 |
| 2 | 丙二醇 | propylene glycol | 18.004 | 1520 |
| 3 | 单,双甘油脂肪酸酯(油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸、山嵛酸、硬脂酸、月桂酸) | mono-and diglycerides of fatty acids | 10.006 | 471 |
| 4 | D-甘露糖醇 | D-mannitol | 19.017 | 421 |
| 5 | 甘油(又名丙三醇) | glycerine(glycerol) | 15.014 | 422 |
| 6 | 瓜尔胶 | guar gum | 20.025 | 412 |
| 7 | 果胶 | pectins | 20.006 | 440 |
| 8 | 海藻酸丙二醇酯 | propylene glycol alginate | 20.010 | 405 |
| 9 | 海藻酸钠(又名褐藻酸钠) | sodium alginate | 20.004 | 401 |
| | 海藻酸钾(又名褐藻酸钾) | potassium alginate | 20.005 | 402 |
| 10 | 槐豆胶(又名刺槐豆胶) | carob bean gum | 20.023 | 410 |
| 11 | β-环状糊精 | beta-cyclodextrin | 20.024 | 459 |
| 12 | 黄原胶(又名汉生胶) | xanthan gum | 20.009 | 415 |
| 13 | 甲基纤维素 | methyl cellulose | 20.043 | 461 |
| 14 | 聚葡萄糖 | polydextrose | 20.022 | 1200 |
| 15 | 卡拉胶 | carrageenan | 20.007 | 407 |
| 16 | 磷脂 | phospholipid | 04.010 | 322 |
| 17 | 明胶 | gelatin | 20.002 | 428 |
| 18 | 柠檬酸三乙酯 | triethyl citrate | — | 1505 |
| 19 | 羟丙基淀粉 | hydroxypropyl starch | 20.014 | 1440 |
| 20 | 琼脂 | agar | 20.001 | 406 |
| 21 | 三乙酸甘油酯 | triacetin | — | — |
| 22 | 山梨糖醇,山梨糖醇液 | sorbitol and sorbitol syrup | 19.006 | 420(i) 420(ii) |
| 23 | 羧甲基纤维素钠 | sodium carboxy methyl cellulose | 20.003 | 466 |
| 24 | 微晶纤维素 | microcrystalline cellulose | 02.005 | 460(i) |

表 B.1 (续)

| 序号 | 溶剂及载体中文名称 | 溶剂及载体英文名称 | CNS 编码 | INS 编码 |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|--------|
| 25 | 辛,癸酸甘油酯 | octyl and decyl glycerate | 10.018 | — |
| 26 | 辛烯基琥珀酸淀粉钠 | sodium starch octenyl succinate | 10.030 | 1450 |
| 27 | 氧化淀粉 | oxidized starch | 20.030 | 1404 |
| 28 | 异丙醇 | isopropyl alcohol | — | — |
| 29 | 蔗糖脂肪酸酯 | sucrose esters of fatty acid | 10.001 | 473 |
| 注:合适的各种食品原料可用作食品用香精溶剂或载体,不在此表列出。 | | | | |

B.2 其他辅料

其他辅料见表 B.2。

表 B.2 其他辅料

| 序号 | 其他辅料中文名称 | 其他辅料英文名称 | CNS 编码 | INS 编码 |
|----|--|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 半乳甘露聚糖 | galactomannan | 00.014 | — |
| 2 | 苯甲酸及其钠盐(苯甲酸,苯甲酸钠) | benzoic acid, sodium benzoate | 17.001 17.002 | 210 211 |
| 3 | 冰乙酸(低压羰基化法) | acetic acid | 01.112 | — |
| 4 | 冰乙酸(又名冰醋酸) | acetic acid | 01.107 | 260 |
| 5 | 丙二醇脂肪酸酯 | propylene glycol esters of fatty acids | 10.020 | 477 |
| 6 | 丙酸及其钠盐、钙盐(丙酸,丙酸钠,丙酸钙) | propionic acid, sodium propionate, calcium propionate | 17.029 17.006 17.005 | 280 281 282 |
| 7 | 茶多酚(又名维多酚) | tea polyphenol(TP) | 04.005 | — |
| 8 | 5'-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠) | disodium 5'-ribonucleotide | 12.004 | 635 |
| 9 | 醋酸酯淀粉 | starch acetate | 20.039 | 1420 |
| 10 | 淀粉磷酸酯钠 | sodium starch phosphate | 20.013 | — |
| 11 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | butylated hydroxyanisole(BHA) | 04.001 | 320 |
| 12 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯,对羟基苯甲酸乙酯钠) | <i>p</i> -hydroxy benzoates and its salts (sodium methyl <i>p</i> -hydroxy benzoate, ethyl <i>p</i> -hydroxy benzoate, sodium ethyl <i>p</i> -hydroxy benzoate) | 17.032 17.007 17.036 | 219 214 215 |
| 13 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | butylated hydroxytoluene(BHT) | 04.002 | 321 |
| 14 | 二氧化硅 | silicon dioxide | 02.004 | 551 |
| 15 | 二氧化硫 焦亚硫酸钾 焦亚硫酸钠 亚硫酸钠 亚硫酸氢钠 低亚硫酸钠 | sulfur dioxide potassium metabisulphite sodium metabisulphite sodium sulfite sodium hydrogen sulfite sodium hyposulfite | 05.001 05.002 05.003 05.004 05.005 05.006 | 220 224 223 221 222 — |

表 B.2 (续)

| 序号 | 其他辅料中文名称 | 其他辅料英文名称 | CNS 编码 | INS 编码 |
|----|----------------------------|---|------------------|----------|
| 16 | 改性大豆磷脂 | modified soybean phospholipid | 10.019 | — |
| 17 | 甘草抗氧化物 | antioxidant of glycyrrhiza | 04.008 | — |
| 18 | 谷氨酸钠 | monosodium glutamate | 12.001 | 621 |
| 19 | 硅酸钙 | calcium silicate | 02.009 | 552 |
| 20 | 葫芦巴胶 | fenugreek gum | — | — |
| 21 | α -环状糊精 | alpha -cyclodextrin | 18.011 | 457 |
| 22 | γ -环状糊精 | gamma -cyclodextrin | 18.012 | 458 |
| 23 | 黄蜀葵胶 | ablmuschus manihot gum | — | — |
| 24 | 5'-肌苷酸二钠 | disodium 5'-inosinate | 12.003 | 631 |
| 25 | 4-己基间苯二酚 | 4-hexylresorcinol | 04.013 | 586 |
| 26 | 甲壳素(又名几丁质) | chitin | 20.018 | — |
| 27 | 结冷胶 | gellan gum | 20.027 | 418 |
| 28 | L(+)酒石酸 DL-酒石酸 | L(+) -tartaric acid DL-tartaric acid | 01.111 01.313 | 334 — |
| 29 | 酒石酸氢钾 | potassium bitartarate | 06.007 | 336 |
| 30 | 聚丙烯酸钠 | sodium polyacrylate | 20.036 | — |
| 31 | 聚二甲基硅氧烷 | polydimethyl siloxane | 03.007 | 900a |
| 32 | 聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR) | polyglycerol polyricinoleate (polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid)(PGPR) | 10.029 | 476 |
| 33 | 聚甘油脂肪酸酯 | polyglycerol esters of fatty acids(polyglycerol fatty acid esters) | 10.022 | 475 |
| 34 | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温 20) | polyoxyethylene (20)sorbitan monolaurate | 10.025 | 432 |
| | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温 40) | polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate | 10.026 | 434 |
| | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温 60) | polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate | 10.015 | 435 |
| | 聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温 80) | polyoxyethylene (20) sorbitan monoleat | 10.016 | 433 |
| 35 | 聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯 | polyoxyethylene xylitan monostearate | 10.017 | — |
| 36 | 抗坏血酸(又名维生素 C) | ascorbic acid | 04.014 | 300 |
| 37 | 抗坏血酸钙 | calcium ascorbate | 04.009 | 302 |
| 38 | 抗坏血酸钠 | sodium ascorbate | 04.015 | 301 |
| 39 | 抗坏血酸棕榈酸酯 | ascorbyl palmitate | 04.011 | 304 |
| 40 | 酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠) | sodium caseinate | 10.002 | — |

表 B.2 (续)

| 序号 | 其他辅料中文名称 | 其他辅料英文名称 | CNS 编码 | INS 编码 |
|----|---------------------|---|------------------|-------------------|
| 41 | 磷酸 | phosphoric acid | 01.106 | 338 |
| | 焦磷酸二氢二钠 | disodium dihydrogen pyrophosphate | 15.008 | 450(i) |
| | 焦磷酸钠 | tetrasodium pyrophosphate | 15.004 | 450(iii) |
| | 磷酸二氢钙 | calcium dihydrogen phosphate | 15.007 | 341(i) |
| | 磷酸二氢钾 | potassium dihydrogen phosphate | 15.010 | 340(i) |
| | 磷酸氢二钾 | dipotassium hydrogen phosphate | 15.009 | 340(ii) |
| | 磷酸氢钙 | calcium hydrogen phosphate (dicalcium orthophosphate) | 06.006 | 341(ii) |
| | 磷酸三钙 | tricalcium orthophosphate (calcium phosphate) | 02.003 | 341(iii) |
| | 磷酸三钾 | tripotassium orthophosphate | 01.308 | 340(iii) |
| | 磷酸三钠 | trisodium orthophosphate | 15.001 | 339(iii) |
| | 六偏磷酸钠 | sodium polyphosphate | 15.002 | 452(i) |
| | 三聚磷酸钠 | sodium tripolyphosphate | 15.003 | 451(i) |
| 42 | 磷酸二氢钠 | sodium dihydrogen phosphate | 15.005 | 339(i) |
| | 磷酸氢二钠 | sodium phosphate dibasic | 15.006 | 339(ii) |
| 42 | 磷酸化二淀粉磷酸酯 | phosphated distarch phosphate | 20.017 | 1413 |
| 43 | 磷酸酯双淀粉 | distarch phosphate | 20.034 | 1412 |
| 44 | 硫酸钙(又名石膏) | calcium sulfate | 18.001 | 516 |
| 45 | 硫酸铝钾(又名钾明矾) | aluminium potassium sulfate | 06.004 | 522 |
| 46 | 硫酸锌 | zinc sulfate | 00.018 | — |
| 47 | 罗望子多糖胶 | tamarind polysaccharide gum | 20.011 | — |
| 48 | 氯化钙 | calcium chloride | 18.002 | 509 |
| 49 | 氯化钾 | potassium chloride | 00.008 | 508 |
| 50 | 氯化镁 | magnesium chloride | 18.003 | 511 |
| 51 | 麦芽糖醇,麦芽糖醇液 | maltitol and maltitol syrup | 19.005 19.022 | 965(i) 965(ii) |
| 52 | 没食子酸丙酯(PG) | propyl gallate(PG) | 04.003 | 310 |
| 53 | 酶解大豆磷脂 | enzymatically decomposed soybean phospholipid | 10.040 | — |
| 54 | 迷迭香提取物 ^a | rosemary extract | 04.017 | 392 |
| 55 | 木糖醇酐单硬脂酸酯 | xylitan monostearate | 10.007 | — |
| 56 | 纳他霉素 | natafusin | 17.030 | 235 |
| 57 | 5'-鸟苷酸二钠 | disodium 5'-guanylate | 12.002 | 627 |
| 58 | 柠檬酸 | citric acid | 01.101 | 330 |
| 59 | 柠檬酸钾 | tripotassium citrate | 01.304 | 332(ii) |
| 60 | 柠檬酸钠 | trisodium citrate | 01.303 | 331(iii) |
| 61 | 柠檬酸亚锡二钠 | disodium stannous citrate | 18.006 | — |

表 B.2 (续)

| 序号 | 其他辅料中文名称 | 其他辅料英文名称 | CNS 编码 | INS 编码 |
|----|--------------------------------|---|------------------|------------|
| 62 | 柠檬酸一钠 | sodium dihydrogen citrate | 01.306 | 331(i) |
| 63 | 柠檬酸脂肪酸甘油酯 | citric and fatty acid esters of glycerol | 10.032 | 472c |
| 64 | 偏酒石酸 | metatartaric acid | 01.105 | 353 |
| 65 | L-苹果酸 | L-malic acid | 01.104 | — |
| 66 | DL-苹果酸 | DL-malic acid | 01.309 | 296 |
| 67 | DL-苹果酸钠 | sodium DL-malate | 01.314 | 350(ii) |
| 68 | 葡萄糖酸- δ -内酯 | glucono delta-lactone | 18.007 | 575 |
| 69 | 葡萄糖酸钠 | sodium gluconate | 01.312 | 576 |
| 70 | 羟丙基二淀粉磷酸酯 | hydroxypropyl distarch phosphate | 20.016 | 1442 |
| 71 | 羟丙基甲基纤维素(HPMC) | hydroxypropyl methyl cellulose | 20.028 | 464 |
| 72 | 氢化松香甘油酯 | glycerol ester of hydrogenated rosin | 10.013 | — |
| 73 | 氢氧化钙 | calcium hydroxide | 01.202 | 526 |
| 74 | 氢氧化钾 | potassium hydroxide | 01.203 | 525 |
| 75 | 氢氧化钠 | sodium hydroxide | — | 524 |
| 76 | 乳酸 | lactic acid | 01.102 | 270 |
| 77 | 乳酸钙 | calcium lactate | 01.310 | 327 |
| 78 | 乳酸钾 | potassium lactate | 15.011 | 326 |
| 79 | 乳酸链球菌素 | nisin | 17.019 | 234 |
| 80 | 乳酸钠 | sodium lactate | 15.012 | 325 |
| 81 | 乳酸脂肪酸甘油酯 | lactic and fatty acid esters of glycerol | 10.031 | 472b |
| 82 | 乳糖醇(4- β -D 吡喃半乳糖-D-山梨醇) | lactitol | 19.014 | 966 |
| 83 | 山梨醇酐单月桂酸酯(又名司盘 20) | sorbitan monolaurate | 10.024 | 493 |
| | 山梨醇酐单棕榈酸酯(又名司盘 40) | sorbitan monopalmitate | 10.008 | 495 |
| | 山梨醇酐单硬脂酸酯(又名司盘 60) | sorbitan monostearate | 10.003 | 491 |
| | 山梨醇酐三硬脂酸酯(又名司盘 65) | sorbitan tristearate | 10.004 | 492 |
| | 山梨醇酐单油酸酯(又名司盘 80) | sorbitan monooleate | 10.005 | 494 |
| 84 | 山梨酸及其钾盐(山梨酸, 山梨酸钾) | sorbic acid, potassium sorbate | 17.003 17.004 | 200 202 |
| 85 | 双乙酰酒石酸单双甘油酯 | diacetyl tartaric acid ester of mono (di) glycerides(DATEM) | 10.010 | 472e |
| 86 | 酸处理淀粉 | acid treated starch | 20.032 | 1401 |
| 87 | 羧甲基淀粉钠 | sodium carboxy methyl starch | 20.012 | — |
| 88 | 碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙) | calcium carbonate(light and heavy) | 13.006 | 170(i) |
| 89 | 碳酸钾 | potassium carbonate | 01.301 | 501(i) |
| 90 | 碳酸镁 | magnesium carbonate | 13.005 | 504(i) |
| 91 | 碳酸钠 | sodium carbonate | 01.302 | 500(i) |

表 B.2 (续)

| 序号 | 其他辅料中文名称 | 其他辅料英文名称 | CNS 编码 | INS 编码 |
|---|---|--|----------------------------|--------------------|
| 92 | 碳酸氢铵 | ammonium hydrogen carbonate | 06.002 | 503(ii) |
| 93 | 碳酸氢钾 | potassium hydrogen carbonate | 01.307 | 501(ii) |
| 94 | 碳酸氢钠 | sodium hydrogen carbonate | 06.001 | 500(ii) |
| 95 | 碳酸氢三钠(又名倍半碳酸钠) | sodium sesquicarbonate | 01.305 | 500(iii) |
| 96 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | tertiary butylhydroquinone(TBHQ) | 04.007 | 319 |
| 97 | 田菁胶 | sesbania gum | 20.021 | — |
| 98 | 脱氢乙酸及其钠盐(脱氢乙酸, 脱氢乙酸钠) | dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate | 17.009(i) 17.009(ii) | 265 266 |
| 99 | 维生素 E(<i>dl</i> - α -生育酚, <i>d</i> - α -生育酚, 混合生育酚浓缩物) | vitamin E (<i>dl</i> - α -tocopherol, <i>d</i> - α -tocopherol, mixed tocopherol concentrate) | 04.016 | 307 |
| 100 | 亚麻籽胶(又名富兰克胶) | linseed gum | 20.020 | — |
| 101 | 亚铁氰化钾 | potassium ferrocyanide | 02.001 | 536 |
| 102 | 盐酸 | hydrochloric acid | 01.108 | 507 |
| 103 | 氧化羟丙基淀粉 | oxidized hydroxypropyl starch | 20.033 | — |
| 104 | 乙二胺四乙酸二钠 | disodium ethylene-diamine-tetra-acetate | 18.005 | 386 |
| 105 | 乙酸异丁酸蔗糖酯 ^b | sucrose acetate isobutyrate(SAIB) | — | 444 |
| 106 | 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯 | acylated mono-and diglyceride (acetic and fatty acid esters of glycerol) | 10.027 | 472a |
| 107 | 乙酰化二淀粉磷酸酯 | acylated distarch phosphate | 20.015 | 1414 |
| 108 | 乙酰化双淀粉己二酸酯 | acylated distarch adipate | 20.031 | 1422 |
| 109 | D-抗坏血酸及其钠盐(D-抗坏血酸,D-抗坏血酸钠) | D-isoascorbic acid (erythorbic acid), sodium D-isoascorbate | 04.004 04.018 | 315 316 |
| 110 | 硬脂酸钾 硬脂酸钙 硬脂酸镁 | potassium stearate calcium stearate magnesium stearate | 10.028 10.039 02.006 | — — 470(iii) |
| 111 | 硬脂酰乳酸钠 硬脂酰乳酸钙 | sodium stearoyl lactylate calcium stearoyl lactylate | 10.011 10.009 | 481(i) 482(i) |
| 112 | 皂莢糖胶 | glechoma sinensis lam gum | 20.029 | — |
| 113 | 植酸(又名肌醇六磷酸) | phytic acid (inositol hexaphosphoric acid) | 04.006 | 391 |
| 114 | 紫胶(又名虫胶) | shellac | 14.001 | 904 |
| 注: 食品用香精中允许加入各种食品原料。 | | | | |
| ^a 包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法), CNS 编码 04.022。 | | | | |
| ^b 乙酸异丁酸蔗糖酯的质量规格应符合附录 D 的规定。 | | | | |

附录 C

检验方法

C.1 一般规定

本标准所用试剂和水在未注明其他要求时,均指分析纯试剂和 GB/T 6682 规定的三级水。试验中所用标准溶液、杂质测定用标准溶液、制剂和制品在未注明其他要求时,均按 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603 的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时,均指水溶液。

C.2 色状的检定

C.2.1 液体香精和浆膏状香精

将试样和对照品分别置于带刻度的同体积的 50 mL 或 100 mL 小烧杯中至同刻度处,用目测法观察有无差异。

C.2.2 固体(粉末)香精

将试样和对照品分别置于一洁净白纸上,用目测法观察有无差异。

C.3 香味的评定

C.3.1 试液的配制

按加香产品的类别,选择下列一种方法配制:

- 分别称取 0.01 g~0.1 g, 精确至 0.001 g, 试样和对照品置于各自 50 mL 或 100 mL 小烧杯中, 分别加入糖水溶液(蔗糖 8 g~12 g, 柠檬酸 0.10 g~0.16 g, 加蒸馏水至 100 mL 配成), 配制成含 0.01%~0.1% 香精糖水溶液, 搅拌均匀即为试液;
- 分别称取 0.2 g~0.5 g, 精确至 0.01 g, 试样和对照品置于各自 50 mL 或 100 mL 小烧杯中, 分别加入盐水溶液(0.5 g 食盐, 加开水至 100 mL 配成, 冷却), 配制成含 0.2%~0.5% 香精的盐水溶液, 搅拌均匀即为试液;
- 分别称取 0.01 g~0.1 g, 精确至 0.001 g, 试样和对照品置于各自 50 mL 或 100 mL 小烧杯中, 分别加入 100 mL 蒸馏水, 配制成含 0.01%~0.1% 香精的水溶液, 搅拌均匀即为试液。

C.3.2 评定的方法

分别小口品尝试液,辨其香味特征、强度、口感有无差异,试样应符合同一型号的对照品。每次品尝前,均应漱口。

C.4 粒度的测定

C.4.1 乳化香精

C.4.1.1 生物显微镜法(仲裁法)

C.4.1.1.1 仪器和设备

大于 600 倍的生物显微镜。

C.4.1.1.2 测定方法

取少量经搅拌均匀的试样放在载玻片上,滴入适量的水,用盖玻片轻压试样使成薄层。用显微镜观察。

C.4.1.2 粒度分析仪法

C.4.1.2.1 仪器与设备

激光粒度分析仪,配置湿法分散单元。

C.4.1.2.2 测定方法

C.4.1.2.2.1 根据实际情况设定样品折光指数和相对密度,颗粒类型设为球型,选择将水为分散剂,分析模型设为通用,分析结果类型设为体积分布。

C.4.1.2.2.2 测量前请在仪器上设置如下参数:

- a) 待测乳化香精的折光指数:按实测值输入;
- b) 待测乳化香精的密度:按实测值输入;
- c) 分散介质(水)的折光指数:1.33;
- d) 吸光值:0.001;
- e) 循环次数:3 次;
- f) 样品测量时间分别设置为 5 s~15 s。

C.4.1.2.2.3 测定步骤

在烧杯中装入 500 mL~800 mL 纯净水,开启搅拌,转速约 2 000 r/min(当样品颗粒较大、检测器遮光度不稳定时,可适当增大泵转速或开启超声,如果样品有成团现象开启超声有助于分散)。

先测量背景,当背景测量完成以后并提示“加入样品”后,向烧杯中缓缓滴加待测量样品,直至遮光度显示稳定在设定范围内(一般为 5%~15%),然后单击“开始”或按“测量样品”开始进行样品粒径分布测量,仪器会进行样品的测量。每测量一次,结果会记录编号和时间,存在已经指定的文件里。最终所采集的 3 次循环测量数据,在软件上创建平均结果。

C.4.2 胶囊型固体(粉末)香精

用标准筛过筛的方法测定。

方法一:除另有规定外,称取 10 g 试样,精确至 0.1 g,置于规定号的标准筛中,筛上加盖并在筛下配备有密合的接收容器,按水平方向旋转振摇 3 min 以上,并不时在垂直方向轻叩筛网。取接收容器内的颗粒及粉末,称重,计算其所占的百分比(%)。

方法二:除另有规定外,称取 30 g 试样,精确至 0.1 g,置于规定号的大号标准筛中,筛上加盖并在筛下配备有密合的接收容器,按水平方向旋转振摇至少 3 min,并不时在垂直的方向轻叩筛网。然后将容器内试样全部移入规定号的小号标准筛中,重复以上操作。称取小号标准筛内的颗粒及粉末重量(即能通过大号标准筛而不能通过小号标准筛的颗粒及粉末),计算其所占的百分比(%)。

C.5 原液稳定性的测定

C.5.1 仪器和设置

离心沉淀器。

C.5.2 测定方法

将经搅拌均匀的试样装于3支离心试管中至同刻度处,1支留作对照,另2支放入离心沉淀器中,以2500 r/min~3000 r/min转速离心15 min,取出。与对照管比较,应不分层。

C.6 千倍稀释液稳定性的测定

注：选择下列两种方法中的一种方法进行测定。

C.6.1 72 h 试验(仲裁法)

C.6.1.1 仪器和设备

C.6.1.1.1 1 000 mL 容量瓶。

C.6.1.1.2 汽水瓶。

C.6.1.1.3 封盖机。

C.6.1.1.4 天平:精度 0.01 g。

C.6.1.2 测定方法

称取经搅拌均匀的试样 1.0 g, 白砂糖 0 g~200 g, 柠檬酸 1.0 g~1.6 g, 蒸馏水 100 mL, 加热使之全部溶解。冷却后移入容量瓶中, 再用蒸馏水稀释至刻度, 即为千倍稀释液。

取约 300 mL 的千倍稀释液于无色透明汽水瓶中, 封盖。在室温下横放静置 72 h, 观察溶液表面应无浮油, 底部无沉淀。

C.6.2 离心试验

C.6.2.1 仪器和设备

离心沉淀器。

C.6.2.2 测定方法

将 C.6.1.2 中的千倍稀释液装于 3 支离心试管中至同刻度处，1 支留作对照，另 2 支放入离心沉淀器中，以 3 000 r/min 转速离心 15 min，取出。与对照管比较，溶液表面应无浮油，底部无沉淀。

C.7 皂化值和乙酸异丁酸蔗糖酯含量的测定

按 GB/T 14455.6 的规定。称样量约为 1 g。

皂化值 S 按式(C.1)计算：

式中：

56.1——氯氧化钾的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);

c ——盐酸标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

V_0 ——空白试验所耗用的盐酸标准溶液的体积,单位为毫升(mL);

V_1 ——试样测定时所耗用的盐酸标准溶液的体积, 单位为毫升(mL);

m ——试样的质量, 单位为克(g)

乙酸异丁酸蔗糖酯含量 w , 按式(C.2)计算:

式中：

S ——皂化值,单位为毫克每克(mg/g);

846.9——乙酸异丁酸蔗糖酯的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);

8 ——换算系数；

1 000——换算系数；

56.1 ——氢氧化钾的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。

附录 D

食品用香精辅料 乙酸异丁酸蔗糖酯的质量规格

D.1 范围

本标准适用于由蔗糖、乙酸酐和异丁酸酐为原料制得的食品用香精辅料乙酸异丁酸蔗糖酯。其化合物系所有可能结合形式的酯类的混合物,其中乙酸酯和异丁酸酯的比约为2:6。

D.2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


D.2.1 化学名称

乙酸异丁酸蔗糖酯

D.2.2 分子式

$C_{40}H_{62}O_{19}$

D.2.3 结构式



D.2.4 相对分子质量

846.9(按2016年国际相对原子质量)。

D.3 技术要求

D.3.1 感官要求

感官要求应符合表D.1的规定。

表 D.1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
|-----|------------------|-----------------------|
| 色 泽 | 无色至淡黄色 | |
| 状态 | 黏稠液体(40℃以下流动性下降) | 将试样置于比色管内,用目测法观察色泽和状态 |

D.3.2 理化指标

理化指标应符合表 D.2 的规定。

表 D.2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
|--------------------------------|------------|---------------------------|
| 皂化值(以 KOH 计)/(mg/g) | 524~540 | 附录 C 中 C.7 |
| 乙酸异丁酸蔗糖酯含量, $w/\%$ | 98.8~101.9 | 附录 C 中 C.7 |
| 酸值(以 KOH 计)/(mg/g) \leqslant | 0.2 | GB/T 14455.5 ^a |
| 铅(Pb)/(mg/kg) \leqslant | 1.0 | GB 5009.75 或 GB 5009.12 |
| ^a 称样量约为 50 g。 | | |